

Zusammenfassung der Auswirkungen von handelsüblichen Futtermischungen



| Eigenschaften | Folgen der Eigenschaften | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Hoher Energiegehalt | Verfettung | <ul style="list-style-type: none"> – schlechtes Putzverhalten – Fliegenbefall (Lebensgefahr!) – schlechtere Aufnahme des Blinddarmkots – Arthrose – Wunde Läufe – erhöhtes Narkoserisiko – Herzprobleme – Bewegungsunlust |
| Stärke und Zuckergehalt | Senkung des pH-Wertes der Darmflora und damit Zerstörung der guten Darmbakterien | <ul style="list-style-type: none"> – Anfälligkeit für Endoparasiten (z. B. Kokzidien und Würmer) – chronischer Durchfall – Fliegenbefall (Lebensgefahr!) – Trommelsucht (Lebensgefahr!) |
| quellende, gepresste Bestandteile | <ul style="list-style-type: none"> – Nachquellung im Magen – schnelle Sättigung – Wasserentzug | <ul style="list-style-type: none"> – Geringere Aufnahme von Heu und Wiese – Magenüberladung (Lebensgefahr!) – Aufgasung (Lebensgefahr!) – Nieren- und Blasenprobleme |
| Kohlenhydrate | Reaktion mit Motilinrezeptoren der Darmwand und damit Verlangsamung der Magen-Darm-Bewegung | <ul style="list-style-type: none"> – Magenüberladung (Lebensgefahr!) – Aufgasung (Lebensgefahr!) |
| Trockenfutterpartikel kleiner als 3mm | Verlangsamung des Magen-Darm-Bewegung | <ul style="list-style-type: none"> – Magenüberladung (Lebensgefahr!) – Aufgasung (Lebensgefahr!) |
| quellende, zu langsam weiterwanderndes Futter | weniger Zahnabrieb | <ul style="list-style-type: none"> – Zahnfehlstellung |